

COVID-19 Delta 變異毒株

什麼是 Delta 變異毒株？

德爾塔 (Delta) 變異毒株這種版本的病毒是目前在美國發現的主要 COVID-19 變種病毒。與其他變異株相比，該病毒結構發生了變化，更容易感染人。



感染 Delta 變異毒株的症狀是什麼？

Delta 變異毒株的症狀與其他版本的病毒沒有很大區別；然而，它們可能導致人們更快感染。症狀包含咳嗽、呼吸急促、發燒、畏寒、肌肉痠痛、頭痛、喉嚨痛和喪失味覺或嗅覺。



誰有因 Delta 變異毒株生病或住院的風險？

未接種疫苗的人感染 Delta 變異毒株、生病或住院的風險更高。



保護自己免於感染 Delta 變異毒株的最佳方法是什麼？

接種疫苗是保護自己免於感染 COVID-19 並將病毒傳染給他人的最佳方法。



我們目前的 COVID-19 疫苗對 Delta 變異毒株有效嗎？

是的，美國目前所有可接種的疫苗都可以降低感染 Delta 變異毒株或任何其他 COVID-19 變體、病重、住院或死亡的可能性。



感染 Delta 變異毒株並已接種疫苗的人能傳播該種疾病嗎？

完全接種疫苗的個人被感染並將病毒傳播給他人的可能性要小得多；而那些接種疫苗並確實感染了 COVID-19 的人，其患嚴重疾病的可能性也要小得多。與其他高危人群（免疫功能低下、未接種疫苗）或自身高危人群密切接觸並已接種疫苗的人，應採取進一步的預防措施。



保護自己和他人：

接種疫苗

接種疫苗並儘快完成第二次注射！在 www.Othena.com 上預約，或撥打 OC COVID-19 熱線 714-834-2000 尋求幫助。

檢測

無論您是否接種了疫苗，或者您是否因為與其他感染了 COVID-19 的人有密切接觸而感到擔憂，如果您出現類似 COVID 的症狀（咳嗽、流鼻涕、發燒），請進行檢測：

- 聯絡您當地的醫療衛生提供者或定購檢測套件以在家中進行自我測試：
<https://occcovid19.ochealthinfo.com/covid-19-testing>
- 如果您生病了，請留在家裡
- 遵循工作場所/學校的檢測建議

預防

採取其他預防措施以限制感染或傳播 COVID-19 的風險：

- 在室內公共場所戴口罩
- 避開人多的地方
- 在通風不良的地方保持人身距離
- 經常洗手/使用洗手液

檢測



在您的手機上掃描下面的二維條碼，了解更多資訊：

疫苗事實

