

COVID-19 델타 변이

델타 변이란 무엇입니까?

델타 변이는 미국에서 흔히 관찰되는 COVID-19 변이 바이러스 버전입니다. 바이러스 구조에 변형이 생겨 다른 변이에 비해 사람들을 감염시키기 쉽습니다.



델타 변이의 증상은 무엇입니까?

델타 변이의 증상은 다른 바이러스 변이와 크게 다르지 않습니다. 그러나 증상이 더욱 빠르게 악화될 수 있습니다. 증상에는 기침, 숨 가쁨, 열, 오한, 근육통, 두통, 인후통, 미각 또는 후각 상실이 포함됩니다.



델타 변이로 인해 아프거나 입원할 위험성이 있는 사람은 누구입니까?

백신을 접종하지 않은 사람들은 델타 변이에 감염되어 질환을 앓거나 입원할 위험성이 높습니다.



델타 변이에서 자신을 보호하기 위한 최선의 방법은 무엇입니까?

백신 접종으로 COVID-19 감염으로부터 자신을 보호하고 바이러스를 타인에게 전파하지 않게 막는 것이 최선의 방법입니다.



자신과 타인을 보호하는 방법:

백신 접종

백신을 접종하고 최대한 빨리 두 번째 접종을 마치십시오!
www.Othena.com에서 예약을 진행하거나 OC COVID-19 핫라인(714-834-2000)에 연락해 도움을 요청하시기 바랍니다.

검사

백신 접종 여부와 관계없이 COVID와 비슷한 증상(기침, 콧물, 열)이 있거나 COVID-19 환자와 밀접 접촉을 해 우려되는 경우 검사를 받으십시오.

- 지역 의료인에게 연락하거나 집에서 검사할 수 있도록 키트를 주문합니다.
<https://ocovid19.ochealthinfo.com/covid-19-testing>
- 아픈 경우 집에 머무릅니다
- 직장/학교의 검사 권고를 따릅니다



보유 중인 COVID-19 백신이 델타 변이에도 효과가 있습니까?

예, 현재 미국에서 이용 가능한 모든 백신은 델타 변이 또는 기타 COVID-19 변이에 걸리거나, 심하게 아프거나, 입원하거나, 사망할 확률을 줄입니다.



백신을 접종했으나 델타 변이에 감염된 사람들이 병을 전염시킬 수 있습니까?

접종 완료자는 감염되어 바이러스를 타인에게 전염시킬 확률이 훨씬 낮습니다. 백신을 접종하고 COVID-19에 걸린 사람은 심각한 질병에 걸릴 가능성이 훨씬 적습니다. 고위험군에 속한 사람(면역 저하, 백신 미접종)과 밀접 접촉을 한 백신 접종자 또는 본인이 고위험군인 경우 더욱 세심한 주의를 기울여야 합니다.

예방

COVID-19에 걸리거나 전파할 위험성을 제한하기 위한 기타 예방 조치를 취합니다.

- 실내 공공장소에서는 마스크를 착용합니다
- 사람이 많은 장소를 피합니다
- 환기가 이루어지지 않는 장소에서는 물리적 거리를 유지합니다
- 정기적으로 손을 씻거나 손 세정제를 사용합니다

휴대전화로 QR 코드를 스캔해 자세한 정보를 확인하십시오.

검사



백신 관련 사실

