

### تزریق بوستر

افراد واجد شرایط می‌توانند انتخاب کنند که کدام واکسن را بعنوان بوستر تزریق کنند. افراد می‌توانند نوع واکسن را تزریق کنند که در ابتدا دریافت کرده اند یا اینکه بوستر دیگری را انتخاب کنند. توصیه‌های CDC اکنون اجازه می‌دهد تا این نوع دوز ترکیبی و مطابقت با واکسن اولیه برای تزریق بوستر انجام شود.


#### فایزر و مدرنا




بوستر واکسن کووید-۱۹ در دسترس دریافت کنندگانی است که دوره اولیه واکسن خود را حداقل 6 ماه پیش تکمیل کرده‌اند و حداقل ۱۸ سال یا بیشتر سن دارند.

#### جانسون اند جانسون

بوستر واکسن کووید-۱۹ در دسترس دریافت کنندگانی است که واکسن جانسون اند جانسون را حداقل ۲ ماه پیش دریافت کرده‌اند و حداقل ۱۸ سال یا بیشتر سن دارند.



### سومین دوز دوز اضافی برای سیستم ایمنی ضعیف



دوز سوم برای افراد دارای سیستم ایمنی ضعیف با شدت متوسط تا شدید - که دوره اولیه واکسیناسیون آنها یک دوره دو دوزی فایزر (Pfizer) یا مدرنا (Moderna) بود - توصیه می‌شود تا پاسخ ایمنی آنها به واکسن افزایش یابد. یک دوز بوستر را می‌توان شش ماه پس از دریافت دوز سوم تزریق کرد.

با استفاده از QR کد زیر جزئیات بیشتری در مورد واکسن بوستر و دوز سوم دریافت کنید:



برای اطلاعات بیشتر در مورد محل دریافت واکسن کووید-۱۹، از [COVIDvaccinefacts.com](https://www.COVIDvaccinefacts.com) دیدن کنید یا روی QR کد کلیک کنید:



یافتن واکسن کووید-۱۹: مجموعه ای از واکسن‌ها در دسترس اورنج کانتی موجود است و راه‌های مختلفی برای گرفتن نوبت مناسب شما وجود دارد. برای گرفتن نوبت به داروخانه یا ارائه دهنده مراقبت‌های بهداشتی محلی خود مراجعه کنید، یا از سایت [Vaccines.gov](https://www.Vaccines.gov)، [MyTurn.ca.gov](https://www.MyTurn.ca.gov) یا [Othena.com](https://www.Othena.com) دیدن کنید.